

## INFORMACJA O GASTROSKOPII

### **Przeprowadzenie badania**

Badanie jest zwykle przeprowadzane w pozycji leżącej na lewym boku. Wcześniej należy usunąć ewentualne protezy zębowe lub aparat słuchowy, jeśli znajduje się w lewym uchu.

Po miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą lignokainy w areozolu pielęgniarka zakłada między szczęki plastikowy ustnik w celu ochrony gastrokopu.

Następnie badający lekarz wprowadza do jamy ustnej i gardła fiberoskop średnicy około 1cm, prosząc jednocześnie o wykonanie ruchu połykowego. Moment ten może być nieprzyjemny i dawać uczucie duszenia; wymaga współpracy pacjenta z lekarzem wykonującym badanie.

Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego jest w pewnym stopniu nieprzyjemne, ale w zasadzie bezbolesne, podobnie, jak pobieranie wycinków.

Instrument służący do badania jest każdorazowo specjalnie dezynfekowany, dlatego też zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe. Wycinki błony śluzowej pobiera się sterylnymi szczypczykami, co również zabezpiecza przed zakażeniem.

### **Możliwe powikłania**

Powikłania gastrokopii zdarzają się bardzo rzadko. Niemniej jednak pełnego powodzenia tego badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo może nastąpić przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego lub krwawienia, głównie po pobraniu wycinków. Powikłania takie mogą wymagać interwencji chirurgicznej.

### **Postępowanie po badaniu**

**Z powodu miejscowego znieczulenia gardła nie wolno przez 2 godziny po badaniu nic jeść ani pić, aby uniknąć zadławienia.**

Proszę także informować swojego lekarza, jeśli w ciągu kilku godzin będziecie Państwo odczuwać silne bóle jamy brzusznej, bądź zaobserwujecie czarny stolec. Również wystąpienie innych niejasnych dla Pani/Pana objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi.

### **UWAGA!**

**Przed badaniem należy pozostać na czczo (bez jedzenia i picia) conajmniej 6 godzin.**

**Wszystkie planowe leki nasercowe, przeciw nadciśnieniu, astmie, padaczce, należy przyjąć na 3 godziny przed badaniem popijając małą ilością wody.**

Ze względu na różny czas badania, długotrwałą dezynfekcję i niekiedy konieczność wykonywania pilnych badań poza kolejnością, zaplanowany termin endoskopii może ulec niewielkiemu przesunięciu. Prosimy więc o zarezerwowanie sobie odpowiedniej ilości czasu.

Zabrze, dn. ....

### **Oświadczenie pacjenta**

Wyrażam zgodę na wykonanie proponowanego badania

.....

Wyjaśniłem/am wszystkie wątpliwości dotyczące badania.

.....

Nazwisko i imię badanego

.....

Data, czytelny podpis badanego lub prawnego opiekuna